

# L-THYROXINE SERB

## Solution buvable en gouttes



Lévothyroxine

### Quelle est sa composition?

Principe actif:

lévothyroxine sodique ..... 150 µg/ml

soit 5 µg/goutte (1 ml = 30 gouttes)

Excipients:

alcool éthylique à 95%, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, propylène glycol.

Titre alcoolique de la solution: 24,2% (v/v).

### Quelle est la présentation existante?

Flacon compte-gouttes de 15 ml (450 gouttes par flacon).

### A quelle classe pharmacothérapeutique appartient L-THYROXINE SERB

Ce médicament est une HORMONE THYROÏDIENNE.

(H: Hormones systémiques, hormones non sexuelles).

### Titulaire/Exploitant/Fabricant:

SERB S.A.S.

Laboratoires Pharmaceutiques

53 Rue Villiers de l'Isle Adam

75020 Paris

France.

### A quoi sert L-THYROXINE SERB?

Ce médicament est préconisé dans l'hypothyroïdie (activité insuffisante de la glande thyroïde), quelle qu'en soit l'origine.

**Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin parce qu'il convient précisément à votre état de santé actuel. Vous ne devez pas le réutiliser sans nouvel avis médical, ni pour vous ni pour une autre personne.**

### Dans quels cas L-THYROXINE SERB ne doit-il pas être utilisé?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- hyperthyroïdies (activité exagérée de la glande thyroïde),
- maladies cardiaques évolutives ou non stabilisées,
- allergie à l'un des composants de L-THYROXINE SERB.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

### Quelles précautions devez-vous prendre lors de la prise de L-THYROXINE SERB?

Mises en garde spéciales:

#### ATTENTION CE MÉDICAMENT CONTIENT DE L'ALCOOL:

le titre alcoolique de la solution buvable est de 24,2% v/v soit 203 mg d'alcool par ml (30 gouttes = 150 µg de lévothyroxine).

L'obésité sans hypothyroïdie n'est pas une indication des hormones thyroïdiennes utilisées seules ou en association. De faibles doses sont sans action et des doses plus importantes sont dangereuses, surtout associées à des anorexigènes (médicaments «coupe-faim»). L'activité et les éventuels signes d'intolérance n'apparaissent qu'après un temps de latence de l'ordre de 15 jours à 1 mois.

#### Précautions d'emploi:

Prévenir votre médecin en cas de:

- maladies cardio-vasculaires ou d'affections coronariennes (maladie des vaisseaux sanguins irriguant le cœur),
- insuffisance de fonctionnement des glandes cortico-surrénales.

En raison de la présence d'alcool, prévenez également votre médecin en cas de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie ou de grossesse. A utiliser avec précaution chez l'enfant.

En règle générale, le traitement doit faire l'objet d'une surveillance clinique et biologique.

**En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

Interactions médicamenteuses et autres interactions:

**Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Grossesse – Allaitement: Un traitement à base d'hormones thyroïdiennes doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. L'allaitement est possible pendant le traitement.

**D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.**

Liste des excipients ayant un effet notoire:

alcool éthylique à 95% (203 mg/ml), huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.

## Comment devez-vous utiliser L-THYROXINE SERB

Dans tous les cas, respecter strictement l'ordonnance de votre médecin.

Mode et voie d'administration:

Voie orale. Pour éviter tout risque de surdosage, ne pas administrer le produit directement dans la bouche du patient, notamment chez les jeunes enfants.

Ce médicament est à prendre de préférence le matin à jeûn.

**Mode d'emploi du flacon compte-gouttes:**

Ce flacon compte-gouttes de sécurité a été mis au point pour éviter les accidents chez les enfants.

**Au moment de l'utilisation:**

- retourner le flacon verticalement;
- attendre quelques instants, sans secouer, que l'écoulement goutte à goutte se produise.

En cas de retard à l'écoulement, il peut être nécessaire de tapoter légèrement le fond du flacon.



**Après usage:**

- refermer le flacon avec précaution afin de ne pas abîmer le compte-gouttes.

Durée du traitement:

L'hypothyroïdie est souvent une maladie définitive et le traitement doit alors être poursuivi indéfiniment. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage:

S'il s'agit d'une intoxication aiguë, il est impératif de consulter votre médecin.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise:

Si une dose a été omise, reprenez le traitement sans augmenter les doses. Si plusieurs doses ont été omises, contactez votre médecin.

## Quels sont les effets indésirables possible de L-THYROXINE SERB?

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants:

- signes d'hyperthyroïdie (tachycardie, insomnie, excitabilité, céphalées, élévation de la température, sueurs, amaigrissement rapide, diarrhée). Prévenez votre médecin,
- possibilité d'aggravation de toute maladie cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde, troubles du rythme),
- chez l'enfant, possibilité d'hypercalciurie (taux de calcium trop élevé dans les urines),
- en raison de la présence d'huile de ricin polyoxyéthylénée, possibilité de nausées, de vomissements, de coliques.

**Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.**

## Comment L-THYROXINE SERB doit-il être conservé?

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation:

La solution buvable doit être conservée à une température comprise entre +2 °C et +8 °C.

## Date de révision:

Juillet 2007

**Ne jamais laisser un médicament à la portée des enfants**

**Laboratoires SERB**  
53 Rue Villiers de l'Isle Adam  
75020 Paris - FRANCE